

2025 年 11 月 17 日

天藤製薬株式会社

【ボラギノールプレミアムシリーズ】販売開始のお知らせ

ボラギノールブランド等を展開する天藤製薬株式会社(本社：大阪府豊中市)は「ボラギノールプレミアムシリーズ」(OTC 医薬品：指定第 2 類医薬品)を BORRA オンラインショップ (<https://www.borra-brand.com/>) にて販売開始いたしました。

天藤製薬株式会社は、ボラギノールを通じ約 100 年、一人ひとりの痔による悩みや不安に寄り添う中で、黄色の A シリーズは発売から 30 年以上が経過しております。長くご愛顧いただいている中で、「昔からある」「変わらない」という変化を感じにくいというお声もいただいております。そこで、現代に合わせた新たな処方の検討を行い、痔疾用薬の専門メーカーとして培ってきた技術と知見を結集し、ボラギノール史上、有効成分を最大量配合(※1)した“ボラギノールプレミアムシリーズ”を開発しました。

「ボラギノールを超えるのはボラギノールだけ」という想いのもと、天藤製薬はこれからも安らぎと感動を提供するべく、新しい価値としてのサービスを引き続き発信してまいります。

【ボラギノール史上、有効成分最大量配合(※1)】

ボラギノール®からプレミアムシリーズが新登場

<発売日：2025 年 11 月 17 日(月)>

「ボラギノール」から痔疾用薬の新製品として「ボラギノールプレミアムシリーズ」が新登場。シリーズ史上、有効成分を最大量配合。つらい痔による痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。



販売名：ボラギノールプレミアム坐剤



販売名：ボラギノールプレミアム注入軟膏



販売名：ボラギノールプレミアム軟膏

第2類医薬品

ポイント①ボラギノール史上、有効成分を最大量配合(※1)

ボラギノールプレミアムシリーズは、抗炎症成分、局所麻酔成分や血行促進成分に加え局所のかゆみをしずめる抗ヒスタミン成分、患部を消毒し、菌の繁殖を抑える殺菌成分、さらに炎症をやわらげる抗炎症成分も配合しています。痔による痛み・出血・はれ・かゆみに対して、よりすぐれた効果を目指し、ボラギノール史上、有効成分を最大量配合しています。つらい痔の症状にしっかりとアプローチします。

ステロイド性抗炎症成分
プレドニゾロン酢酸エステル
炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。
※全タイプに配合

局所麻酔成分
リドカイン
局所の痛み、かゆみをしずめます。
※全タイプに配合

組織修復成分
アラントイン
傷の治りをたすけ、組織を修復します。
※全タイプに配合

血行促進成分
ビタミンE酢酸エステル
(トコフェロール酢酸エステル)
末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。
※全タイプに配合

抗ヒスタミン成分
クロルフェニラミンマレイン酸塩
局所のかゆみをしずめます。
※ボラギノールプレミアム軟膏、ボラギノールプレミアム注入軟膏に配合

殺菌成分
イソプロピルメチルフェノール
患部を消毒し、菌の繁殖を抑えます。
※ボラギノールプレミアム軟膏、ボラギノールプレミアム注入軟膏に配合

抗炎症成分
グリチルレチン酸
炎症をやわらげます。
※ボラギノールプレミアム注入軟膏、ボラギノールプレミアム坐剤に配合

ポイント②痔の発生箇所に応じた“ピンポイント処方”

痔は種類によって発生する箇所が異なります。そのため、有効成分をしっかりと患部に届けるには、症状に合ったくすりの形（剤形）を選ぶことが重要です。外用の痔の薬には「坐剤」「注入軟膏」「軟膏」の3タイプがあります。ボラギノールプレミアムシリーズは、それぞれの剤形に合わせて異なる処方設計を採用しました。

	主に肛門内側の痔に 坐剤	肛門の内と外の痔に 注入軟膏	主に肛門の外側・肛門付近の痔に 軟膏
成分名			
プレドニゾロン酢酸エステル	○	○	○
リドカイン	○	○	○
アラントイン	○	○	○
ビタミンE酢酸エステル (トコフェロール酢酸エステル)	○	○	○
クロルフェニラミンマレイン酸塩	×	×	○
イソプロピルメチルフェノール	×	○	○
グリチルレチン酸	○	○	×

製品情報

・ボラギノールプレミアム坐剤

商品名	ボラギノールプレミアム坐剤
効能	いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和
用法・用量	被包を除き、次の量を肛門内に挿入すること。 【成人（15歳以上）】1回量：1個、1日使用回数：1～2回 【15歳未満】使用しないこと
注意	【用法・用量に関連する注意】 ▪ 坐剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。寒い時期や低温での保管により坐剤表面が硬くなりすぎた場合は、手であたため表面をなめらかにした後に使用すること。 ▪ 肛門にのみ使用すること。 ▪ 用法・用量を厳守すること。
成分	【1個（1.75g）中】 プレドニゾン酢酸エステル1mg／炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。 リドカイン60mg／局所の痛み、かゆみをしずめます。 グリチルレチン酸10mg／炎症をやわらげます。 アラントイン20mg／傷の治りをたすけ、組織を修復します。 ビタミンE酢酸エステル（トコフェロール酢酸エステル）60mg／末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。
添加物：ハードファット	

・ボラギノールプレミアム注入軟膏

商品名	ボラギノールプレミアム注入軟膏
効能	注入時：いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和 塗布時：いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和および消毒
用法・用量	【肛門内に注入する場合】 ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入すること。 【成人（15歳以上）】1回量：1個、1日使用回数：1～2回 【15歳未満】使用しないこと 【患部に塗布する場合】 次の量を肛門部に塗布すること。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。 【成人（15歳以上）】1回量：適量、1日使用回数：1～3回 【15歳未満】使用しないこと
注意	【用法・用量に関連する注意】 ▪ 肛門部にのみ使用すること。 ▪ 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用すること。 ▪ 用法・用量を厳守すること。
成分	【1個（2g）中】 プレドニゾン酢酸エステル1mg／炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。 リドカイン60mg／局所の痛み、かゆみをしずめます。 イソプロピルメチルフェノール2mg／患部を消毒し、菌の繁殖を抑えます。 グリチルレチン酸10mg／炎症をやわらげます。 アラントイン20mg／傷の治りをたすけ、組織を修復します。 ビタミンE酢酸エステル（トコフェロール酢酸エステル）60mg／末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。
添加物：白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン 注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。	

・ボラギノールプレミアム軟膏

商品名	ボラギノールプレミアム軟膏
効能	いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和および消毒
用法・用量	次の量を肛門部に直接塗布するか、またはガーゼなどにのぼして肛門部に貼付すること。 【成人（15歳以上）】1回量：適量、1日使用回数：1～3回 【15歳未満】使用しないこと
注意	【用法・用量に関連する注意】 ▪ 肛門部にのみ使用すること。 ▪ 用法・用量を厳守すること。
成分	【1g中】 プレドニゾン酢酸エステル1mg／炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。 リドカイン30mg／局所の痛み、かゆみをしずめます。 クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg／局所のかゆみをしずめます。 イソプロピルメチルフェノール1mg／患部を消毒し、菌の繁殖を抑えます。 アラントイン10mg／傷の治りをたすけ、組織を修復します。 ビタミンE酢酸エステル（トコフェロール酢酸エステル）30mg／末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。
添加物：白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、軽質無水ケイ酸	

※この医薬品は、薬剤師、登録販売者に相談のうえ、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

※1 ボラギノールプレミアム坐剤のグリチルレチン酸を除く